

# PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.<sup>(1)</sup>

## Protocole d'administration : tableau des posologies

POIDS DU PATIENT	POSOLOGIE PAR ADMINISTRATION	VOLUME PAR ADMINISTRATION	VOLUME MAXIMAL PAR ADMINISTRATION SUR LA BASE DES LIMITES SUPÉRIEURES DU POIDS DU GROUPE (ML)*	POSOLOGIE JOURNALIÈRE MAXIMALE
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg à ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg sans dépasser 2 g
> 33 kg à ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg sans dépasser 3 g
> 50 kg avec des facteurs de risque d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg sans facteur de risque d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	4 g

10 mg = 1 ml

Poids du patient  kg

Volume  ml

Quantité  mg

\*Les patients ayant un poids inférieur doivent recevoir des volumes plus réduits.

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est de 6 heures au minimum.

Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

<sup>(1)</sup>Résumé des Caractéristiques du Produit



# PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est de 6 heures au minimum.

Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

kg - Poids du patient

50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ml - Volume

75	73,5	72	70,5	69	67,5	66	64,5	63	61,5	60	58,5	57	55,5	54	52,5	51	49,5	48	46,5	45	43,5	42	40,5	39	37,5	36	34,5	33	31,5	30	28,5	27	25,5	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5,2	4,5	3,7	3	2,2	1,5	0,75
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	------

mg - Quantité

750	735	720	705	690	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450	435	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	7,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Résumé des Caractéristiques du Produit.

# PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

## Chez l'enfant ayant un poids $\leq$ 10 kg :

- La posologie chez ces patients est de 7,5 mg/kg.
- Le volume maximal de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml à administrer ne doit jamais dépasser 7,5 ml pour la limite supérieure de cette tranche de poids. Des volumes plus petits sont requis pour les poids inférieurs à 10 kg.
- La poche ne doit pas être utilisée directement en perfusion compte tenu du petit volume du médicament à administrer dans cette population.
- Une seringue de 5 ou 10 ml doit être utilisée afin de mesurer la dose appropriée selon le poids de l'enfant et le volume à prélever.
- Le volume à administrer doit être prélevé de la poche et peut être administré en l'état ou dilué (dans un volume allant de 1 à 9) dans une solution de chlorure de sodium à 0,9% ou de glucose à 5% et administré en 15 minutes.

## Chez les enfants, adolescents et adultes ayant un poids $>$ 33 kg et $\leq$ 50 kg :

- Chez ces patients la posologie est de 15 mg/kg par dose. La posologie journalière maximale ne doit pas dépasser 3 g par 24 heures.
- Le volume de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml administré ne doit jamais dépasser 75 ml par dose.

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit.



AGUETTANT  
MÉDICAMENTS  
ESSENTIELS